

## Régebbi Matek M1 zh-k

Elemi gráfelméleti tudnivalókkal, fákkal,  
Euler- és Hamilton-utakkal/körökkel,  
elemi valószínűségyszámítási tudnivalókkal  
kapcsolatos feladatai.

### Gráfok

1. Igazoljuk, hogy nincs olyan 11 pontú gráf, mely izomorf lenne a komplementumával.
2. Legyen  $n$  adott természetes szám, és legyen  $V$  az  $n$ -hosszú  $(0, 1)$ -sorozatok halmaza. A  $\mathcal{G}$  gráf csúcshalmaza  $V$ , és két csúcs pontosan akkor van összekötve, ha (mint sorozatok) 1 helyen térnek el. Mely  $n$  értékekre tartalmaz  $\mathcal{G}$  Euler-köröket ?
3. Igazoljuk, hogy ha egy  $n$  csúcsú gráfnak legalább  $\frac{n^2 - 2n + 2}{2}$  darab éle van, akkor a gráfban van Hamilton-kör. (Útmutatás: hány éle lehet legfeljebb egy olyan gráfnak, melyre nem teljesül a Dirac-feltétel ?)
4. A  $G$  gráf csúcsai az  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  halmaz 3-elemű részhalmazai; az  $a \neq b$  csúcsok között pontosan akkor van él, ha  $a \cap b \neq \emptyset$ . Igazoljuk, hogy  $G$  izomorf  $K_{10}$ -el.
5. A legalább 3 csúcsú  $G$  gráfra teljesül, hogy tetszőleges csúcsát elhagyva a maradék gráfban van Euler-kör. Igazoljuk, hogy van olyan páros  $n$  szám, melyre  $K_n$  és  $G$  izomorfak.
6. Legyen  $A = \{1, 2, \dots, 2016\}$ . A  $G$  gráf csúcsai az  $A \times A$  halmaz elemei; az  $\langle a, b \rangle$  és  $\langle c, d \rangle$  csúcsok között él van, ha  $a - c$  nem osztható 3-al, és  $b \neq d$ . Van-e  $G$ -ben Hamilton-kör ?
7. A  $G$  gráf csúcsai az  $\{1, 2, 3, \dots, 2016\}$  halmaz 3-elemű részhalmazai; az  $a \neq b$

csúcsok között pontosan akkor van él, ha az  $a$ -beli és  $b$ -beli számok összege egyaránt páros, vagy egyaránt páratlan. Összefüggő-e a  $G$  gráf ?

8. Adjunk példát olyan  $G$  gráfra, melyben van Hamilton-kör, de nem teljesül rá az Ore-feltétel.

9. Adjunk példát olyan  $G$  gráfra, melyben van Euler-kör, de nincs Hamilton-kör. Indokoljunk.

1. Igazoljuk, hogy ha  $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$  egy  $n$ -csúcsú fa, akkor

$$\sum_{x \in V} d(x) = 2n - 2.$$

10. A 2017-reguláris  $\mathcal{G}$  gráf komplementuma 2016-reguláris. Igazoljuk, hogy  $\mathcal{G}$ -ben van Hamilton-kör.

11. A  $\mathcal{G}$  gráf csúcsai az  $A = \{1, 2, \dots, 10\}$  halmaz 2-elemű részhalmazai; az  $x, y$  csúcsok között pontosan akkor megy él, ha  $|x \cap y| = 1$ . Van-e Euler-kör  $\mathcal{G}$ -ben ? Indokoljunk.

12. Van-e olyan 100-csúcsú  $\mathcal{G}$  gráf, hogy  $\mathcal{G}$ -ben és  $\mathcal{G}$  komplementumában is van Euler-kör ? Indokoljunk.

13. Igazoljuk, hogy ha egy  $\mathcal{G}$  gráfnak 10 csúcsa és 38 éle van, akkor  $\mathcal{G}$ -ben van Hamilton-kör.

14. Adjunk példát két, azonos csúcsszámú, 3-reguláris nem izomorf gráfra. Indokoljunk.

15. Igazoljuk, hogy ha egy  $n$ -csúcsú  $\mathcal{G}$  gráfban minden pont foka legalább  $\frac{2}{3}n$ , akkor  $\mathcal{G}$ -ben legalább  $\frac{n}{12}$  darab különböző Hamilton-kör van.

16. Van-e olyan 5-pontú fa, mely izomorf a komplementumával? Indokoljunk.

17. Legyenek  $\mathcal{G}_1$ ,  $\mathcal{G}_2$ ,  $\mathcal{G}_3$  olyan gráfok, hogy  $\mathcal{G}_1 \cong \mathcal{G}_2$  és  $\mathcal{G}_2 \cong \mathcal{G}_3$ . Igaz-e, hogy ekkor  $\mathcal{G}_1 \cong \mathcal{G}_3$ ? Indokoljunk.

18. A  $\mathcal{G}$  gráf csúcsai az  $\{1, 2, 3, \dots, 2018\}$  halmaz olyan 3-elemű részhalmazai, melyekben a legnagyobb elem legalább 10; az  $a \neq b$  csúcsok között pontosan akkor van él, ha a  $a$  és  $b$  legnagyobb elemei egyenlőek. Van-e  $\mathcal{G}$ -ben Euler-kör? Indokoljunk.

19. A Dirac-feltétel ellenőrzésével (vagy bármilyen más módon) igazoljuk, hogy bármely, legalább 6 csúcsú, 3-reguláris gráf komplementuma összefüggő. Indokoljunk.

### Valószínűségszámítás

20. Egy piros, és egy kék dobókockával dobunk. Jelölje  $A$  azt az eseményt, hogy a kék kockával dobott szám páros,  $B$  pedig azt az eseményt, hogy a dobott számok összege legalább 10. Független-e  $A$  és  $B$ ?

21. Egy autóbusz munkanapja során 16-szor járja be útvonalát. Egy-egy alkalommal  $p = 0, 1$  valószínűséggel érkezik késve a végállomására. Adjuk meg annak valószínűségét, hogy egy munkanapja során pontosan 3 alkalommal érkezik késve a végállomására.

22. A  $[0, 1]$  valós intervallumban egyenletes eloszlás szerint véletlenül választunk két számot,  $\xi$ -t és  $\eta$ -t. Legyen az  $A$  esemény az, hogy  $\xi + \eta \leq \frac{1}{2}$ , a  $B$  esemény pedig az, hogy  $\xi \leq \frac{1}{4}$ . Független-e  $A$  és  $B$ ?

23. Visszatevés nélkül kiválasztunk 5 számot az  $\{1, 2, \dots, 90\}$  halmazból. Adjuk meg annak a valószínűségét, hogy a kiválasztott számok közül pontosan  $k$  olyan lesz, mely osztható 3-al,  $n$  olyan lesz, mely 3-al osztva 1-et ad maradékul, és  $m$  olyan lesz, mely 3-al osztva 2-t ad maradékul.

24. Egy folyamatosan üzemelő autóbusz útvonala kör alakú. Minden megállóban (egymástól függetlenül)  $p$  valószínűséggel száll fel ellenőr. Jelölje  $\xi$  azt, hogy az autóbusz hányadik megállása során száll fel az első ellenőr. Számítsuk ki  $\xi$  várható értékét.

25. Egy piros és egy kék szabályos dobókockával dobunk egyszerre. Határozzuk meg a dobott számok maximumának várható értékét.

26. A jegyellenőr  $0,5$  valószínűséggel ellenőriz férfi, illetve nő utasokat. A férfi utasok (a többi utastól teljesen függetlenül)  $0,02$  valószínűséggel bliccelnek; a nők  $0,01$  valószínűséggel bliccelnek. Az ellenőr egy műszak alatt  $200$  utast ellenőriz. Legyen  $\xi$  az ellenőr által megtalált bliccelők száma,  $\eta$  pedig a műszak alatt ellenőrzött férfi utasok száma. Határozzuk meg a  $P(\xi = n \mid \eta = k)$  feltételes valószínűségeket.

27. A  $\xi$  és  $\eta$  valószínűségi változók eloszlása egyenletes a  $[0, 1]$  intervallumon. Határozzuk meg annak valószínűségét, hogy a

$$\begin{pmatrix} \xi & 1 \\ \eta & \xi \end{pmatrix}$$

mátrixnak nemnegatív a determinánsa.

28. A  $\xi$  valószínűségi változó eloszlása egyenletes a  $[0, 1]$  intervallumon. Legyen  $y$  megoldása az  $y' = 2y, y(1) = \xi$  kezdetiérték-problémának. Határozzuk meg  $M(y(2))$  értékét.

29. A  $\xi$  és  $\eta$  valószínűségi változók eloszlása egyenletes a  $[0, 1]$  intervallumon. Határozzuk meg annak valószínűségét, hogy  $\min\{\xi, \eta\} \leq \xi^3$ . Indokuljunk.

30. A  $\xi$  és  $\eta$  valószínűségi változók eloszlása egyenletes a  $[-1, 1]$  intervallumon. Határozzuk meg annak valószínűségét, hogy a  $\underline{v} = [1, \xi, \eta]$  vektorra  $|\underline{v}| \leq \sqrt{2}$  teljesül (azaz, hogy  $\underline{v}$  hossza legfeljebb  $\sqrt{2}$ ).

31. A  $\xi$  valószínűségi változó eloszlása egyenletes a  $[-10, 10]$  intervallumon. Legyen  $y$  megoldása az  $y'' = 3, y(0) = \xi, y'(0) = 0$  kezdetiérték-problémának. Határozzuk meg  $P(y(1) \leq 8)$  értékét.

32. A  $\xi$  és  $\eta$  valószínűségi változók eloszlása egyenletes a  $[-1, 1]$  intervallumon. Határozzuk meg annak valószínűségét, hogy a  $q(x) = x^2 + \xi \cdot x + \eta$  polinomra  $q(1) \geq 1$  teljesül.

33. A  $\xi$  valószínűségi változó eloszlása egyenletes a  $[-10, 10]$  intervallumon. Legyen  $y$  megoldása az  $y'' = 5$ ,  $y(0) = \xi$ ,  $y'(0) = 0$  kezdetiérték-problémának. Határozzuk meg  $y(1)$  eloszlásfüggvényét.